メモ正解

第3回糖尿病教室；運動療法について

< 前回の復習 >

生活習慣病とは、偏食、過食などの不規則な食生活、運動不足や睡眠不足、ストレス、タバコやお酒の飲み過ぎなどの悪い習慣が要因となり起こる。逆に生活習慣を改める事で予防可能である。

肥満には、内蔵型肥満（リンゴ型肥満）と皮下脂肪型肥満（洋ナシ型肥満）があり、内蔵型肥満は生活習慣病を合併しやすく、動脈硬化を来しやすい。

糖尿病の治療は食事・運動・薬物による治療だが、肥満の解消と血糖・血圧・脂質のコントロールを行い、合併症の予防につなげる事が最終的な目標である。

運動療法の効果とは、

1. (血糖値) が下がる
2. (食後) の血糖値の上昇を防ぐ。
3. (インスリン) の効きが良くなる。
4. 筋肉で (ブドウ糖) が利用されやすくなる。

そして、その他に (肥満) の予防・改善。(ストレス) の解消にもつながる。

GLUTとは、ブドウ糖が細胞の膜を通過するのに必要な蛋白質で、担体（運び屋の意味）と呼ばれます。

糖尿病の場合、(インスリン) の分泌や働きが悪く、インスリン受容体からの指令が上手く伝わらない為、GLUTが細胞の表面に出て来られません。しかし運動による (筋肉の収縮) が刺激となって、細胞の中にあるGLUTの (数) が増え、血糖

の取り込みが多くなります。

< 1 単位 (80kcal) を消費するおよその運動時間 (体重 60kg 男性) >

ラジオ体操 25 分、散歩 (ゆっくり) 30 分、歩く (普通に) 20 分、速歩 15 分、
ジョギング (ゆっくり) 10 分、ジョギング (はやめ) 8 分、サイクリング (ゆっくり) 15
分

階段昇降 15 分、日本舞踊 27 分、社交ダンス 23 分、ジャズダンス 10 分、スイミン
グ (ゆっくり) 11 分、スイミング (はやめ) 7 分、テニス (練習) 10 分、ゴルフ 16 分、
バドミントン (練習) 9 分、歩くスキー 12 分

< 運動を禁止・中止する場合と注意点 >

運動禁止：血糖コントロールが未調整、血圧が高い、合併症 (腎臓、網膜症)

尿ケトン体陽性、発熱、不整脈・狭心症など

中止：運動中に胸痛や強い空腹感・ふるえ・動機・冷汗・吐き気・目のかすみ

頭痛、発熱、腹痛などの体調に異常

注意点：運動療法の前には、医師の診察を受け、適切な運動強度・方法・量について指示

インスリンや経口糖尿病薬を使用している場合、砂糖などの低血糖対策を！

運動前後は準備体操、整理体操を忘れずに。

運動中、前後と水分補給を

では、実際に運動に必要なものは？

身体、身支度、安全な環境、運動する意欲

今回は、現在の生活に加えて運動を行うという条件で考えます。

運動は (A METs メッツ) という物で分類できます。

A は運動強度を示し、指標に METs (メッツ) を使います。

1 METs ; 座っている。

1.5 METs ; 入浴、食事

2 METs ; ; 室内歩行

3 METs ; ; (階段昇降、散歩)

6 METs ; スコップでの雪かき

運動強度とは、

最大強度の 50% ~ 70% で (有酸素) 運動としての運動効果が得られます。

又、70% 以上で (無酸素) 運動としての運動効果が得られます。

また身体活動量の少ない人、心肺機能が低下している人では、(40~49)%で心肺機能の改善がみられる事が分かっています。

活動量の計算：

3 METs の活動を 1 時間行くと、3 EX (エクササイズ)

例：散歩 (3 METs) を 30 分行うと、

$3 \text{ METs (メッツ)} \times 0.5 \text{ 時間} = 1.5 \text{ EX (エクササイズ)}$ となります。

目標運動量は、 1 週間 (23) EX 以上です。

実際には、持続しての運動をしなくても、短い時間の運動をマメに行う事でも効果あり。

運動の効果を評価する方法

話し方テスト

隣の人と数語の話が出来、少し息が切れる程度が丁度良い状態。

会話不能なら負荷の掛けすぎ、おしゃべりが続けられる場合は軽すぎる。

心拍数計測

最大心拍数 = $220 - \text{年齢}$ [心拍数の上限値]

適度な心拍数として、

目標心拍数 (カルボーネン法)

$(\text{最大心拍数} - \text{安静時心拍数}) \times \text{運動強度} + \text{安静時心拍数}$

* 但し運動強度は 0.4 ~ 0.7 の値が有酸素運動として妥当。

ストレッチの重要性

いきなり運動をしても、肉離れやケガをすると大変です。

ストレッチの効果

筋肉など組織の柔軟性の改善

筋肉や精神の緊張緩和

血流改善

神経機能の向上 などがあります。

ストレッチのポイント

ゆっくり (30) 秒間行い、筋肉を持続的に伸ばします。必ず左右とも行います。